

Emmanuel DE BROS. — Papillons du Valais : Deux observations intéressantes.

Caradrina wullschlegeli Pglr. — Cette petite Noctuelle grise insignifiante a été découverte en 1905 à Zermatt par Püngeler et n'avait jamais été prise ailleurs, en Suisse ou dans les Alpes ; elle serait donc encore plus localisée que la célèbre Arctiide *O. cervini* Fallou. Or le Dr P. Le Coultre en a pris un exemplaire à Montana le 23.7.35, et, dans la même station, j'en ai retrouvé 2, les 12 et 27 juin 1948, lors de chasses à la lampe à la route de Vermala (alt. 1550 m.). M. Charles Boursin, le spécialiste parisien des Noctuidae, qui a découvert ces trois exemplaires dans ma collection, m'écrit à ce sujet :

« On a retrouvé *C. wullschlegeli* avant la guerre, et assez communément, en Bulgarie : massif du Pirin et Rilo-Dagh, ainsi qu'en Anatolie : Ak-Schehir-Tschiftlik et Bolu, en Bithynie (ssp. *schwungenschussi* Brsn.). Cette *Caradrina* est un élément montigène de l'Asie antérieure et sa présence en Suisse est à rapprocher de celle de *Dich. vallesiaca* B., *Dasypolia ferdinandi* Rühl et *Autophila hirsuta* Stgr., bien que les biotopes de certaines de ces espèces soient différents. »

• *Zygaena fausta* L. ssp. *jucunda* Meisn. — Dans leur « Faune des Macro-Lépidoptères du Valais » parue en 1899, E. Favre et A. Wullschlegel écrivent (p. 75-76) que cette élégante Zygène aux taches rouges cerclées de jaune, la plus petite de nos espèces, très localisée, se trouve entre autres « près de Sierre, où elle devient de plus en plus rare ». Cinquante ans après, le Prof. Dr Burgeff, un des meilleurs spécialistes des Zygènes, l'y cherchait en vain et on pouvait craindre sa disparition. Or mon collègue sierrois M. Buro l'a retrouvée le 15 août 1950 dans une station extrêmement restreinte où, en 1 heure de recherche attentive, nous en avons observé 2 douzaines environ. Malgré l'intérêt qu'il présente, le biotope ne sera pas publié, pour éviter à cette intéressante population tout risque d'être anéantie !